Lb. 72
Kart. B 140 5731

Gradabtheilung 70. Blatt 46.

Coburg.

Breite 50°/51°, Länge 28°|29°.

Topogr. Aufnahme des Kgl. Preuss. Generalstabes 1836 u. 1880. Nachträge durch die Kgl. Preuss. geolog. Landesanstalt 1892.
Herausgegeben von der Kgl. Preuss. geolog. Landesanstalt 1895. Lieferung 72.

Geognost. bearbeitet im Thüring. Antheil durch H. Loretz 1881 u. 1883–85, im Bayer. Antheil durch das Kgl. Bayer. Oberbergamt zu München.

Berliner lithogr. Institut.

Mittlerer Keuper.

- kmi — Bunte Mergel mit Steinmergellagen und Gypsresiduen.
- Obere Steinmergelbank nächst dem Thonquarzit.
- 7 — Thonquarzit, Corbulabank.
- 6 — Estherienschichten.
- km2 — Feinkörniger Sandstein (Schilfsandstein).
- km1 — Bunte Keuperletten (Berggypsstufe).
- 5 — Lehrbergschicht: Steinmergelbänke m. Turbonilla Theodori.
- km5 — Bunte Keupermergel m. Steinmergellagen u. schwachen Sandsteinbänken zwischen Lehrbergschicht und Coburger Bausandstein.
- 4 — Stärkere Sandsteinbänke in km4 (vielleicht z. Th. = 3 auf Blatt Heidburg).
- ym — Gypsmergel in km4.
- km3 — Coburger Bausandstein (Semionotus-Sandstein).
- km2 — Bunte Keuperletten m. weissen Sandsteinbänken.
- 3 — Stärkere Sandsteinbänke in km2.
- ym — Gypsmergel in km2.
- km1 — Dolomitische Arkose (nebst Keuperletten und Sandstein).
- km0 — Lockerer grobkörniger Sandstein (nebst dolomit. Arkose und Keuperletten).
- km0 — Oberste rothe Keuperletten.

Oberer Keuper (Rhät).
- ko — Meist grobe lichtgelbe Sandsteine.

Unterer Lias.
- jlu — Feinkörnige plattige Sandsteine m. Thonlagen.

Diluvium.

- ds, dz — ds Schotter mit Thüringer Wald-Geschieben. dz Schotter einheimischer Gesteine.
- d — Lehm.
- Zerstreute Geschiebe. (Reste von Schotterlagern.)

Alluvium.

- a — Ebener Thalboden der Gewässer.
- as — Deltabildungen, Schuttkegel.
- Blicke von ko auf km9.
- Verwerfungen.
- Streichen u. Fallen der Gebirgsschichten.

In Commission bei der Simon Schropp'schen Hoflandkarten-Handlung (I. H. Neumann) in Berlin W. Jägerstr. 61.