

Leinf. 16

Kart. B 140 4332

Grad-Abtheilung 56 (Breite 52° Länge 28° 29') Blatt 23.

(Quedlinburg)

Harzgerode



(Hasselfelde)

A N H A L T

P R E U S S E N

E R E

N

R E I C H S M A S S T A B 1 : 25 0 0 0
 L e n g t e n M a s s t a b 1 : 25 0 0 0
 F ü r d i e H o r i z o n t a l e n b e i 5 R a d i e n . 5 0 D o r . F a s s H ö h e n A b s t a n d
 L i t h A n s t v L e o p o l d K r a t z i n B e r l i n

Aufgenommen v. Kgl. Preuss. Generalstabe i. J. 1852.

Geognostisch bearbeitet durch KA. Lossen.

Älteres hercynisches Schiefergebirge. (- F.G.H. Barrande.)				(Schwenda)				Tanner Grauwacke (h ₁) u. Wieder Schiefer (h ₂) innerhalb der Contactzone des Ramberg-Granits.					
h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆
Tanner Grauwacke u. Plattensteine	Wieder Schiefer	Kalkstein-Einlager. in h ₂	Kieselsteine-Einlager. in h ₂	Onkischen-Einlager. in h ₂	Blauer Quarzit in h ₂	Quarzit im Liegenden des Haupt-Granit.	Spätkristallin-artig	Auere Kautschuk-Lone.	Mittlere Harz-Lone.	Jüngere Zone im Rücken-schiefergebirge	Ungegliederte Contact-düngel der Wieder Schiefer (h ₂) am Westrand des Granits.	Kalkhorst-Git. zu h ₂ gehörig	Tesaurum-Granit-Einlager. zu h ₂ gehörig
Erptiv-Gesteine.	Erptiv-Gesteine.	Alluvium.	Zerst. Diluv-Geschiebe.	Erzgänge.	Erzgänge.	Mineralgänge.	Stollwerke, und Querschläge.						
Porphyroide (h ₁ und h ₂)	Körniger Diabas (D), um den Ramberg-Granit verändert (umwandelnd) u. Diabasbreccie (Di).	Granit.	Ablagerungen in den Thälern.	Feuerstein.	Ältere Quarzit.	Ältere Quarzit.							