

Lin. 25


Kart. B 140

4730

Grad Abtheilung 56. (B. 56° L. 28° 29')

(39 [297, Jmmenrode])

45 Ebeleben.



Topogr. Aufnahme des Kgl. Preuss. Generalstabs 1855 mit neueren durch die Kgl. geologische Landesaussicht veranlassten Nachtragungen.

Mittl. Muschelkalkform.		Obere Muschelkalkformation.		Untere Keuperformation.		(St. Tennstedt)		Diluvium		Alluvium	
mm	mo1	mo2	ku1	ku2	km	g	n	e	l	a	s
	Trochitenkalk.	Schichten mit ammonites nodosus.	Mergel mit Okerdolomit. Letzen u. Sandstein mit Himmelskühle.	Genadolomit.	Bunte Schieferletten mit Crapsenlagerungen.	Grund- u. Geschiebelaagerungen.	Nordische Geschiebe: Gr. Granit, Gn. Gneis, Sg. Syenit, pq Quarz-Porphyr, F - Feuerstein.	Einheimische Geschiebe: Braunkohlenquarzit.	Löss u. geschiebefreier Lehm.	Jüngste Ablagerungen der Thalebenen.	Schichtenstörungen.

Schwaiburg - Sondershausen - Preussen Regz Erfurt Kgl. Landesaussicht
 Geogr. Anst. v. Leopold Kraatz in Berlin
 Längen Maassstab 1:25,000
 Breiten Maassstab für die Horizontalen bei 25 Breiten-25 Die. Fuss Höhen Abstand
 Die Zahlen geben die absoluten Höhen an. Die Fuss über der Meeres an.