



Topogr. Aufnahme des Kgl. Preuss. Generalstabes 1858.
Herausgegeben von der Kgl. Preuss. geogr. Landesanstalt 1890. (II. Ausgabe) Lieferung I.
Geognostisch aufgenommen durch E. Beyrich 1863 u. 66.

Älteres Hercynisches Schiefergebirge (- F. G.H. Barrande.)										Unterdevon.										Oberes Carbon										Unteres									
h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	h ₉	h ₁₀	h ₁₁	h ₁₂	h ₁₃	h ₁₄	h ₁₅	h ₁₆	h ₁₇	h ₁₈	h ₁₉	h ₂₀	h ₂₁	h ₂₂	h ₂₃	h ₂₄	h ₂₅	h ₂₆	h ₂₇	h ₂₈	h ₂₉	h ₃₀	h ₃₁	h ₃₂	h ₃₃	h ₃₄	h ₃₅	h ₃₆	h ₃₇	h ₃₈	h ₃₉	h ₄₀
Tanner Grauwacke.	Wieder Schiefer.	Kalkstein-Einlager im Wieder Schiefer.	Kiesel-schiefer-Einlager im Wieder Schiefer.	Grauwacke-Einlager im Wieder Schiefer.	Haupthieselschiefer.	Zorgener Schiefer.	Kiesel-schiefer-Einlager im Zorge-Schiefer.	Grauwacke-Einlager im Zorge-Schiefer.	Elbinger Grauwacke.	Liegende Conglomerate.	Slo.	p.	Dat.	Schieferletten u. Sandst. ohne Conglomerat.	Kalksteinlagerung im Unteren Rothliegenden.	Porphyri-Tuff und Conglomerat.	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇	D ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	D ₁₂	D ₁₃	D ₁₄	D ₁₅	D ₁₆	D ₁₇	D ₁₈	D ₁₉	D ₂₀	a		
Rothliegendes.																	Fleckiger Sandstein.	Dichter Porphyrtuff.	Porphyri-Krystall-Tuff.	Conglomerat, vorwiegend aus Porphyrmaterial.	Walkenreider Sand.	Zechstein Conglom. u. Kalkstein-schieferflöz.	Zechstein.	Dolomit.	Hercynischer Schotter.	Löss u. geschubfreier Lehm.	Dichter Diabas.	Strahlig körniger Diabas.	Felsitischer Porphyri mit Plutstructur.	Ergänge Erzlager u. Quarzader. K.Eisen.	Stollen-Schächte-Tongen.								

NIEDERS. STAATS- u. UNIV. BIBLIOTHEK GÖTTINGEN

Geograph. Seminar
4225
Göttingen.

Lith. Anst. v. Leop. Kraatz in Berlin.